

krinidat követően maximum két héig használhatja fel, alkalmazás azépsztikus technikát és minimális ideig tartsa a hőmérsékletet mély. Jézegye fel a kinyitás után azonnal a hűtőszekrénybe, maximum két hét elteltével dobják a felesleges állapotokat.

Használási útmutató

Az alábbi rész a Rapidivit™ Oocyte felhasználására vonatkozó általános eljárást írja le.

A vírtíflektóció kizárólag a vírtíflektóció eljárásokhoz képzett személyek végezheti.

Megeggyezés: A vírtíflektóció eljárások esetében nem szabad a hűtőszekrényből közvetlenül az arra, hogy pontosan követse a protokollt.

Vírtíflektóci

Tegyen a több-osztatú edény kúmba 1 nykubla 1 ml-t az alábbi állapotokból, majd melegítse 5-10 percig a kúmba kinyitása előtt.
• Vitr 1™ Oocyte
• Vitr 2™ Oocyte
• Vitr 3™ Oocyte

A patesetek manipulálásá 37°C-on kell végezni (melegítőpalán) légtörni környezetben. Nagyon fontos, hogy minden vizet hideg forrásból, 37°C-on tartson. A 37°C-ot való eltérés megváltoztatja a krioconserváltság permeabilitását, ami meghosszabbítja a pateset túlélési idejét.

MEGEGGYÉZÉS: Az ajánlott mennyiségnek nem szabad módosulnia. A nem megfelelő mennyiség használata megváltoztatja a krioconserváltságot, ami a pateset túlélését elmarhat az optimálisít.

A patesetek letelezését követően krioconserválást kell tartani egyháttól 37°C-on tartó medialiszt. Kúmbókat kell órával a kinyerés után végezze át a patesetek denudálására. Ha a patesetek vírtíflektóciás nem kerül sor közvetlenül a kúmba után, akkor G-1™ PLUS oldattal kell helyezni őket a vírtíflektóció időpontjára. Hejyezze át a pateseteket a Vitr 1™ Oocyte kúmbába. A pateset kúmba legfeljebb 5. de legfeljebb 20 percig az oldattal kell maradniuk.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

A patesetek letelezését követően krioconserválást kell tartani egyháttól 37°C-on tartó medialiszt. Kúmbókat kell órával a kinyerés után végezze át a patesetek denudálására. Ha a patesetek vírtíflektóciás nem kerül sor közvetlenül a kúmba után, akkor G-1™ PLUS oldattal kell helyezni őket a vírtíflektóció időpontjára. Hejyezze át a pateseteket a Vitr 1™ Oocyte kúmbába. A pateset kúmba legfeljebb 5. de legfeljebb 20 percig az oldattal kell maradniuk.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Specifikáció

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Precauzioni

Attenzione: la legge federale (degl Stati Uniti) limita la vendita del presente dispositivo dietro prescrizione medica.

La sicurezza è lungo termine della

vitrtíflektóció su bambini nati secondo metodo di crioconservazione degli ovociti non è stata stabilita.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei feti (includi le gravidanze IVF) Vitróline, non sono stati determinati e sono stati classificati come sconosciuti.

La sicurezza e l'efficacia della vitrtíflektóció non è stata completamente valutata negli ovociti umani.

Precauzioni

Scartare il prodotto se l'integrità della bottiglia è compromessa. Non utilizzare Rapidivit™ Oocyte se presenta un aspetto torbido. Rapidivit™ Oocyte contiene gentamicina e albumina del siero umano.

Attenzione: tutti gli emodivalenti devono essere trattati con cautela. Evitare il contatto diretto prima prime impiegate per questi prodotti sono risultate negative ai test per gli anticorpi di HIV-1, HIV-2, HCV e HTLV III e non risultate positive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e sifilide. Nessun metodo di prova noto può garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettono agenti infettivi.

Per evitare contaminazioni, Vitróline raccomanda di aprire e utilizzare il prodotto esclusivamente con tecniche asettiche. Non iniezione.

LT: Naudojimo indikacija

Ocitujei naujamišiai terpė.

Produkto aprašas

Rapidivit™ Oocyte sudaro tryjų tipalų, skirti ovocitų vitrtíflektóciui. Tvirtina sudaro MOPS buferinį tirpalą, kuris sudarytas iš gentamicino, veikiamos kaip antibakterinio medžiaga, ir žmogaus serumo albumino. Vitr 1™ Oocyte sudaryta nėra krioconservuoti.

Vitr 2™ Oocyte sudarytė yra etilenglikolio ir propandolio, veikiamų kaip kriooprotektoriai. Vitr 3™ Oocyte sudarytė yra etilenglikolio ir propandolio, veikiamų kaip kriooprotektoriai, ir albumino, veikiamų kaip kriooprotektoriai.

Laikymo nurodymai ir stabilumas

Rapidivit™ Oocyte laikyti +2 iki +8 °C. Laikyti Vitróline™ Oocyte yra stabilūs iki galiojimo datos, nurodytos ant buteliuko etiketės ir ant produkto šaltinis.

Terpes būtina galima naudoti iki dviejų savaičių po pirmojo atidarymo, naukuite aspijuoti metoda ir sumažinti laikymo ne daugiau kaip 24 valandas. Užrašyti atidarymo datą. Pasalinę perkėtinę tiesa, ne vėliau kaip per šis savaites po pirmojo atidarymo.

Naujojioms nurodymai

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

IT: Istruzioni per l'uso

Terrno per la vitrtíflektóció di ovociti.

Descrizione del prodotto

INTEGRATO CON ALBUMINA SIERICA UMANA

Rapidivit™ Oocyte contiene tre soluzioni per vitrtíflektóció di ovociti. Vitróline™ Oocyte sono costituite da un terreno con tampone MOPS contenente gentamicina come agente antibatterico e albumina del siero umano.

Vitr 1™ Oocyte non contiene crioprotettori. Vitr 2™ Oocyte contiene etilenglicolo e propandolo come crioprotettori. Vitr 3™ Oocyte contiene etilenglicolo e propandolo come crioprotettori e albumina del siero umano.

Destinato al uso per il riscaldamento a temperatura ambiente.

Istruzioni per la conservazione e stabilità

Conservare al riparo dalla luce a una temperatura compresa tra +2 e +8 °C. Rapidivit™ Oocyte rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei singoli prodotti.

Dopo la prima apertura è possibile utilizzare i flaconi di ovociti per un periodo di due settimane a temperatura ambiente. Rapidivit™ Oocyte rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei singoli prodotti.

Nota: i tempi delle procedure di vitrtíflektóció sono critici, assicurarsi di seguire accuratamente il protocollo.

Vitrtíflektóci

Posizionare 1 ml, di ciascuno dei seguenti terreni in pozzetti separati di una piastra multipozzetto e riscaldare a 37°C in atmosfera umida.

• Vitr 1™ Oocyte

• Vitr 2™ Oocyte

• Vitr 3™ Oocyte

Tutte le manipolazioni degli ovociti sono effettuate a 37°C (sul piatto riscaldato) in ambiente umido. Rapidivit™ Oocyte deve essere mantenere sempre a temperatura di tutte le soluzioni di vitrtíflektóció a 37°C. Eventuali scostamenti dalla temperatura di 37°C possono ridurre la permeabilità del prodotto, che potrebbe compromettere la sopravvivenza dell'ovocita.

Dopo la raccolta conservare gli ovociti in incubatore con G-1™ PLUS equilibrato a 37°C e 6%CO2. Due ore circa dopo la raccolta decimare gli ovociti. Nel caso di ovociti non destinati alla vitrtíflektóció, procedere alla decimazione, collocarli in G-1™ PLUS fino al momento della vitrtíflektóció. Trasferire gli ovociti in Vitr 1™ Oocyte. Gli ovociti devono restare nella soluzione da un minimo di 5 minuti a un massimo di 20 minuti.

Stipare un numero appropriato di ovociti nella soluzione per vitrtíflektóció. Nel caso di questa soluzione per 2-5 minuti. Gli ovociti tenderanno a galleggiare sulla superficie.

In tal caso, raccoglierei e riposizionari sul fondo della piastra. Gli ovociti dovrebbero essersi allineati al loro volume entro uno 5 minuti. Se l'espansione non avviene entro 5 minuti, può essere necessario il terreno non è a una temperatura di 37°C. La temperatura incide sulla quantità di crioprotettore che entra nell'ovocita e pertanto sulla espansione osservata.

Preparare il criodispositivo per l'uso.

Doce che gli ovociti hanno completo l'espansione, mettere una gocciola di 20 µL di media di vitrtíflektóció in un recipiente sterile, preferibilmente una piastra di coltura.

Una gocciola di Vitr 3™ Oocyte consente un tempo di vitrtíflektóció di 15 secondi. Nota: la temperatura di 37°C è necessaria per assicurare l'efficacia del criodispositivo.

Utilizzo di dispositivi di conservazione

Utilizzare dispositivi di conservazione destinati all'uso nelle procedure di vitrtíflektóció di ovociti umani, per assicurare l'uso di media di vitrtíflektóció in un recipiente sterile, preferibilmente una piastra di coltura. Una gocciola di Vitr 3™ Oocyte consente un tempo di vitrtíflektóció di 15 secondi. Nota: la temperatura di 37°C è necessaria per assicurare l'efficacia del criodispositivo.

Trasferire gli ovociti in un volume minimo di Vitr 2™ Oocyte per evitare la diluizione della media.

Trasferire gli ovociti nella gocciola di 20 µL di Vitr 3™ Oocyte. Miscelare gli ovociti nel Vitr 3™ Oocyte utilizzando la pipetta. Dopo 15 secondi, raccoglierei gli ovociti e riposizionari sul criodispositivo.

NOTA: la temperatura di 37°C è necessaria per assicurare l'efficacia del criodispositivo.

Trasferire gli ovociti nella gocciola di 20 µL di Vitr 3™ Oocyte. Miscelare gli ovociti nel Vitr 3™ Oocyte utilizzando la pipetta. Dopo 15 secondi, raccoglierei gli ovociti e riposizionari sul criodispositivo.

NOTA: il tempo totale trascorso dal momento dell'ovociti nella gocciola di Vitr 3™ Oocyte fino alla vitrtíflektóció dovrebbe essere di 25-35 secondi.

Vitrtíflektóció immediatamente ovociti secondo le istruzioni del criodispositivo.

Utilizzare un sistema di conservazione secondo le procedure di laboratorio.

NOTA: il tempo totale trascorso dal momento dell'ovociti nella gocciola di Vitr 3™ Oocyte fino alla vitrtíflektóció dovrebbe essere di 25-35 secondi.

Vitrtíflektóció immediatamente ovociti secondo le istruzioni del criodispositivo.

Utilizzare un sistema di conservazione secondo le procedure di laboratorio.

Specifiche

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Hejyezze megjelölés ezután patesetet a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába. A pateseteket 2-5 percig kell ebben az oldatban hagyni. Amennyiben a patesetek a felszínen usznak gyűlöse csak, majd helyezni őket a Vitr 2™ Oocyte kúmbába.

Precauzioni

Attenzione: la legge federale (degl Stati Uniti) limita la vendita del presente dispositivo dietro prescrizione medica.

La sicurezza è lungo termine della

vitrtíflektóció su bambini nati secondo metodo di crioconservazione degli ovociti non è stata stabilita.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei feti (includi le gravidanze IVF) Vitróline, non sono stati determinati e sono stati classificati come sconosciuti.

La sicurezza e l'efficacia della vitrtíflektóció non è stata completamente valutata negli ovociti umani.

Precauzioni

Scartare il prodotto se l'integrità della bottiglia è compromessa. Non utilizzare Rapidivit™ Oocyte se presenta un aspetto torbido. Rapidivit™ Oocyte contiene gentamicina e albumina del siero umano.

Attenzione: tutti gli emodivalenti devono essere trattati con cautela. Evitare il contatto diretto prima prime impiegate per questi prodotti sono risultate negative ai test per gli anticorpi di HIV-1, HIV-2, HCV e HTLV III e non risultate positive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e sifilide. Nessun metodo di prova noto può garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettono agenti infettivi.

Per evitare contaminazioni, Vitróline raccomanda di aprire e utilizzare il prodotto esclusivamente con tecniche asettiche. Non iniezione.

LT: Naudojimo indikacija

Ocitujei naujamišiai terpė.

Produkto aprašas

Rapidivit™ Oocyte sudaro tryjų tipalų, skirti ovocitų vitrtíflektóciui. Tvirtina sudaro MOPS buferinį tirpalą, kuris sudarytas iš gentamicino, veikiamos kaip antibakterinio medžiaga, ir žmogaus serumo albumino. Vitr 1™ Oocyte sudaryta nėra krioconservuoti.

Vitr 2™ Oocyte sudarytė yra etilenglikolio ir propandolio, veikiamų kaip kriooprotektoriai. Vitr 3™ Oocyte sudarytė yra etilenglikolio ir propandolio, veikiamų kaip kriooprotektoriai, ir albumino, veikiamų kaip kriooprotektoriai.

Laikymo nurodymai ir stabilumas

Rapidivit™ Oocyte laikyti +2 iki +8 °C. Laikyti Vitróline™ Oocyte yra stabilūs iki galiojimo datos, nurodytos ant buteliuko etiketės ir ant produkto šaltinis.

Terpes būtina galima naudoti iki dviejų savaičių po pirmojo atidarymo, naukuite aspijuoti metoda ir sumažinti laikymo ne daugiau kaip 24 valandas. Užrašyti atidarymo datą. Pasalinę perkėtinę tiesa, ne vėliau kaip per šis savaites po pirmojo atidarymo.

Naujojioms nurodymai

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

Toliau pateiktoms bendrosios Rapidivit™ Oocyte naudojimo instrukcijoms, žiūrėti produkto šaltinis. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė. Vitróline™ Oocyte naujamišiai terpė.

• Vitr 3™ Oocyte

Alle handlingen med de ecielen worden uitgevoerd bij 37°C (op een warmplaat) in de lucht. Het is zeer belangrijk om de temperatuur van alle vloeistofoplossingen steeds op 37°C te houden. Afwijkingen van 37°C wijziging de permeabiliteit van cryoprotectanten, wat de overlevingskans van de ecielen negatief kan beïnvloeden.

Specificatiesjoner

Slent filteret SAL 10-1 (EUI) ≥ 80 Bacterielle endotoxins (LAL-test) [EUI/ml] < 0,5 LOT-spesifikk testresultater er gjengitt på analysecertifikatet som er inkludert i hver kúmba.

OPMERKING: De anbevolnen volumes mogen niet gewijzigd worden. Afwijkingen van het correcte volume van de media, kan ontbreken van de vloeistofoplossingen hebben, wat kan leiden tot suboptimale overlevingskansen voor de ecielen.

Na de ecielen pick-up, moeten de ecielen in een incubator worden bewaard op 37°C. De ecielen G1™ PLUS op 37°C aan 6% CO2. Denuderer de ecielen in ongeveer 2 uur. Indien de ecielen niet onmiddellijk na denudering geïncubeerd worden, moet men ze in G-1™ PLUS geplaatst worden tot het ogenblik van de vitrtíflektóció. Breng de ecielen over in Vitr 3™ Oocyte na het testen op 37°C in 15 minuten, maar maximaal 20 minuten in de oplossing blijven.

Breng een gepast aantal ecielen over naar Vitr 2™ Oocyte. De ecielen worden blootgesteld. De ecielen hebben de neiging om te drijven op de vloeistofoppervlakte van de botten van de well te brengen. De ecielen zullen naar vervaarding binnen de 5 minuten naar de bodem van de well zinken. Wanneer binnen 5 minuten geen re-ëxpansie wordt waargenomen, kan een overmatige blootstelling aan het medium geen 37°C is. De temperatuur heeft een impact op de snelheid waarmee de cryoprotectanten de eciel binnenkomen en op de vloeistofoppervlakte van de waargenomen re-ëxpansie.

Bereid het invriesmateriaal voor.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.

Wanneer de ecielen volledig opnieuw gekoeld zijn, maakt u een 20 µL druppel van Vitr 3™ Oocyte op een niet-gevoelig oppervlak, bij voorkeur een kwiekschaal.